

Belangrijke verschillen tussen kwaliteit van leven en gezondheidsstatus bij oudere patiënten met kritieke ischemie

Achtergrond


Kwaliteit van leven (KvL) is bij oudere patiënten met kritieke ischemie een belangrijke uitkomstmaat. Echter, KvL wordt in de literatuur en praktijk met veel verschillende vragenlijsten gemeten en vaak verward met gezondheidsstatus (GS). KvL meet fysiek, psychologisch en sociaal functioneren **subjectief**, waar GS dit **objectief** meet. Doel van de studie was om KvL en GS van oudere patiënten met kritieke ischemie met elkaar te vergelijken.




Methode

Patiënten >70 jaar werden geïnccludeerd in een prospectieve studie met een follow-up van 1 jaar. Patiënten werden door het multidisciplinair overleg verdeeld in 3 behandelgroepen; endovasculaire, chirurgische en conservatieve behandeling. KvL werd gemeten met behulp van de WHO-QoL Bref, de GS met de SF-12 vragenlijst.

Kwaliteit van leven (fysieke domein)



Gezondheid status (fysieke domein)



Resultaten

Er werden 195 patiënten geïnccludeerd. De fysieke KvL van endovasculair en chirurgisch behandelde patiënten toonde meteen een significante verbetering in tegenstelling tot de fysieke GS die pas na 6 weken in chirurgische patiënten en na 6 maanden in endovasculair behandelde patiënten steeg. Bij conservatief behandelde patiënten was er na 6 en 12 maanden een significante verbetering van de fysieke KvL, dit werd echter niet gezien bij de fysieke GS.

Conclusie

Er is een duidelijk verschil in de uitkomst van KvL en GS bij oudere kritieke ischemie patiënten. Conservatieve behandeling wordt door geselecteerde oudere patiënten met kritieke ischemie als acceptabel beoordeeld met een verbeterde fysieke KvL na 12 maanden. Het is belangrijk om deze twee verschillende uitkomstmaten duidelijk te scheiden van elkaar in de literatuur en praktijk.

S. Steunenber¹; Prof. J. de Vries², Dr. J. Raats¹; N. Verbogt¹; P. Lodder²; GJ. van Eijck³;
Dr. E. Veen¹; Dr. G. Ho¹; H. de Groot¹; Dr. L van der Laan¹

1. Amphia ziekenhuis, afdeling Chirurgie
2. Universiteit van Tilburg, afdeling medische psychologie
3. Bravis ziekenhuis, afdeling Chirurgie

